

Kwaliteits Controle Bureau

Interpretaties bij EU handelsnormen
Lycopersicon / Tomaat

Versie: 013
Versiedatum: 20-04-2017
Pagina : 1 van 3

TOMATEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Vleestomaten worden beschouwd als ronde tomaten.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

A. Minimumeisen

Kleurschaal tomaten

Tomaten, van Nederlandse oorsprong, die meer dan twee kleurschalen onder de voor de periode voorgeschreven kleurschaal liggen (zie DB-besluit april 2000), met een minimum van kleurschaal 2, worden beschouwd als niet conform de minimumeisen:

- Een kleurschaal onder de toegestane: hiervoor geldt een aparte tolerantie van 10%.
- Twee kleurschalen onder de toegestane: deze vallen in de kwaliteitstolerantie onder de 10% gebreken.
- Meer dan twee kleurschalen onder de toegestane: deze vallen in de kwaliteitstolerantie onder de 2% gebreken.
- **Tezamen** mogen de van kleur afwijkende vruchten de 10% niet overschrijden.

Voor buitenlandse tomaten geldt voor alle perioden een minimum kleurschaal van 2.

Voor het beoordelen van de rijpheid van tomaten gelden de volgende ondergrenzen voor de kleur afhankelijk van de periode van het jaar. De kleurschaal is alleen van toepassing op Nederlandse tomaten en met uitzondering van de variëteit Coeur de Boeuf welke groen wordt gegeten.

Verhandeling van grasgroene tomaten (kleurstadium 1), die meestal worden ingelegd in zoetzuur, is toegestaan als klasse I en klasse II.

De grasgroene vruchten moeten binnen een verpakking uniform van kleur, zijnde maximaal kleurstadium 1, zijn.

| Periode | Minimum kleurschaal |
|----------------|---------------------|
| Januari-maart | 5 |
| April-mei | 4 |
| Juni-september | 3 |

Kwaliteits Controle Bureau

Interpretaties bij EU handelsnormen
Lycopersicon / Tomaat

Versie: 013
Versiedatum: 20-04-2017
Pagina : 2 van 3

| | |
|-------------------|---|
| Oktober | 4 |
| November-december | 5 |

Voor trostomaten geldt, dat een tros uit minimaal 2 vruchten moet bestaan.

De naam troscherrytomaat of kerstomaat mag slechts gebruikt worden voor trostomaten, waarvan de grootste diameter max. 40 mm is.

Onder ernstige gebreken wordt verstaan:

- open vruchtvleesbeschadiging;
- inwendig zwarte pitten en vruchten die inwendig hardgroen zijn, ongeacht de kleur van de vruchtwand;
- holle tomaten, waarbij de afstand tussen vruchtwand en vruchtinhoud groter is dan 1 cm.

Voor ernstige gebreken geldt een tolerantie van 2% voor Nederlandse tomaten en 3% voor buitenlandse tomaten.

B. Indeling

ii) Klasse I

Toegestaan is/zijn:

- per vrucht maximaal 4 botrytusstippen, mits niet aaneengesloten;
- bonte vruchten, maar geen afgetekende kleurafwijking;
- een geringe mate van holheid, d.w.z. dat de vruchtwand maximaal voor 2/3 deel over een maximale breedte van ½ cm los mag zijn van de vruchtinhoud. Voor de variëteit Coeur de Boeuf geldt deze omschrijving voor holheid niet;
- zeer lichte kneuzingen;
- kroonloze vruchten;
- een naadvormig bloemlitteken ter grootte van maximaal 2/3 van de diameter;
- aaneengesloten groenkragen tot maximaal 2/3 van het oppervlak;
- tolvorming, mits de vrucht regelmatig gevormd is;
- goudspikkels;
- enigszins kantige vruchten.

Bij trostomaten is/zijn bovendien nog toegestaan:

Kwaliteits Controle Bureau

Interpretaties bij EU handelsnormen
Lycopersicon / Tomaat

Versie: 013
Versiedatum: 20-04-2017
Pagina : 3 van 3

- een sterke mate van geelverkleuring van de kroontjes bij trostomaten is toegestaan, mits de kelkslippen groen zijn en ook de steel tot aan de kelk toe groen is;
- een zekere mate van ringvormige zwelscheurtjes mits de tomaten voldoende stevig zijn en enige glans vertonen;
- een lichte mate van sterscheurtjes onder de kroon (< 1 cm);
- per kleinverpakking is, bij een aantal vruchten per verpakking van 10 of minder, één losse vrucht toegestaan. Bij een aantal vruchten van 11 tot 20 twee losse vruchten, bij meer dan 20 vruchten zijn drie losse vruchten toegestaan.

Bovendien is er een aparte tolerantie van 10% van de kleinverpakkingen, waarin méér dan het aantal bovengenoemde losse vruchten per kleinverpakking mag voorkomen.

Niet toegestaan in klasse I is/zijn:

- grauwe tomaten;
- zachte plekken;
- verkurkte navelvorming > 1 cm²;
- schuitvorming, waarbij het kroontje verzonken is;
- dichtgegroeide scheurtjes met een lengte > 1 cm;
- vruchten met aangroeisels;
- vruchten met kneuzingen of een sterke mate van schuurschade.

Opm. voor buitenlandse trostomaat wordt een wat minder verse trossteel geaccepteerd.

iii) Klasse II

Toegestaan

is/zijn:

- maximaal 10 botrytis stippen per vrucht, waarvan er enkele in elkaar mogen overlopen;
- vruchten waarbij de wand over de gehele oppervlak over een afstand van maximaal 1 cm los is van de vruchthoud. Voor de variëteit Coeur de Boeuf geldt deze omschrijving voor holheid niet.

V. PRESENTATIEVOORSCHRIFTEN

B. Verpakking